



Vacuna viva contra la enfermedad de Marek y la enfermedad de Newcastle.

Suspensión inyectable

USO VETERINARIO



Composición

VECTORMUNE® ND contiene un virus de la Enfermedad de Marek serotipo 3 (Herpesvirus de Pavo o HVT), modificado mediante ingeniería genética, expresando un antígeno protector clave del virus de la enfermedad de Newcastle. La vacuna se presenta en forma congelada asociada a células.

Cada dosis contiene:

Enfermedad de Marek-
Enfermedad de Newcastle
(rHVT/NDV) ≥ 2280 UFP

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Preservantes: Gentamicina,
Anfotericina B.



Indicaciones

VECTORMUNE® ND está recomendada para aves sanas de un día de edad o huevos embrionados de 18-19 días de incubación como ayuda en la prevención de la enfermedad de Newcastle y la enfermedad de Marek.



Administración y dosis

Antes de administrarse, la vacuna debe descongelarse y diluirse apropiadamente con el diluyente específico.

Administre inmediatamente la vacuna y mézclela ocasionalmente para asegurar una suspensión uniforme de células.

Para inyección subcutánea en pollitos/pollitas de 1 día:

Mezclar 200 mL de diluyente por cada 1000 dosis de vacuna para administrar 0,2 mL por pollito de un día. Los pollitos de un día se vacunan por vía subcutánea con 0,2 mL de vacuna en la nuca, para ello utilice una aguja corta (3/8 de pulgada o 1/2 pulgada) de calibre 20 para la vacunación.

Para la vacunación in ovo de embriones de pollo de 18 a 19 días:

Mezclar 100 mL de diluyente por cada 1000 dosis de vacuna para administrar 0,1 mL por embrión de pollo o mezclar 50 mL de diluyente por cada 1000 dosis de vacuna para administrar 0,05 mL por embrión de pollo.

Desinfecte el sistema de inyección de huevos antes y después de su uso siguiendo los procedimientos descritos en el manual del operador.



Advertencias y almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños.

El almacenamiento o manipulación inadecuada de la vacuna pueden provocar una pérdida de su potencia.

La vacuna debe almacenarse en nitrógeno líquido.

Utilice todo el contenido inmediatamente después de la dilución.

No retire la vacuna del nitrógeno líquido hasta que esté lista para su uso.

No vuelva a congelar la vacuna.

No utilizar en aves en postura o dentro de las 4 semanas anteriores al inicio del período de postura.

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

Almacenar la vacuna en nitrógeno líquido ($\leq -196^{\circ}\text{C}$)

El diluyente debe ser almacenado a temperatura ambiente ($15 - 30^{\circ}\text{C}$).



Presentación

Ampollas de vidrio conteniendo 1.000, 2.000 o 4.000 dosis, bolsas plásticas conteniendo 400, 800, 1000 o 12000 mL de diluyente

Fabricado por: Ceva Animal Health, LLC, USA.

Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA.

Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile.



Juntos, más allá de la Salud Animal

