



Vacuna viva recombinante vectorizada contra la Viruela Aviar y Laringotraqueitis Infecciosa Aviar

Polvo liofilizado

Reg. SAG N°2727-B
USO VETERinario



Composición

VECTORMUNE® FP-LT estimula la inmunidad activa contra los virus de la Viruela Aviar y Laringotraqueitis Infecciosa Aviar. Cada dosis reconstituida contiene:
Virus viruela aviar, Cepa Cutter recombinante rFP/LT $\geq 10^{2.7}$ TCID₅₀
Excipientes c.s.p. 1 dosis
Preservantes: Gentamicina, Anfotericina B.



Indicaciones

VECTORMUNE® FP-LT está recomendada para uso en pollos *broilers* y pollas de reemplazo como ayuda en la prevención de la Viruela Aviar y Laringotraqueitis Infecciosa Aviar.

Inicio de la inmunidad: 3 semanas después de la vacunación.

Duración de la inmunidad: por lo menos 24 semanas después de la vacunación.

En huevos embrionados de 18 a 19 días de incubación, se administra una dosis por embrión, aplicando una dosis de refuerzo a los 7 días de edad.

En pollos *broilers* o pollas de reemplazo se administra una dosis por pollo a partir de los 7 días de edad



Administración y dosis

Vacunación por membrana

alar: Para ello diluir 1.000 dosis de vacuna en 10 mL de diluyente azul. Agite bien. Una vez preparada administrar dentro de 2 horas. Sostenga cada ave individualmente y extienda el ala con la parte inferior hacia arriba. Sumerja el aplicador en la vacuna de modo que las ranuras se llenen de líquido para administrar 0,01 mL por pollo. Inserte el aplicador de doble punta en la membrana alar. Evite perforar el músculo del ala, el hueso o los vasos sanguíneos grandes. Vuelva a sumergir el aplicador entre cada vacunación. De 7 a 10 días después de la vacunación, observe varios pollos en busca de evidencia de una reacción local satisfactoria (pápula) que incluya inflamación y formación de costra en el sitio de la aplicación.

Vacunación in ovo: Diluir 1.000 dosis de vacuna en 100 mL de diluyente rojo y administrar 0,1 mL por embrión, o bien diluir 1.000 dosis de vacuna en 50 mL de diluyente rojo y administrar 0,05 mL por embrión. Lea el manual del operador del sistema de inyección de huevos antes de iniciar la vacunación, desinfecte el sistema de inyección antes y después del uso.



Advertencias y almacenamiento

Los pollos que reciban esta vacuna no deben haber sido vacunados previamente con la vacuna contra la viruela aviar. Sólo se puede lograr una protección satisfactoria en aves sanas. Todas las aves de la bandada deben ser vacunadas al mismo tiempo. La vacunación debe completarse al menos 4 semanas antes del inicio de la postura. El almacenamiento o manipulación inadecuados de la vacuna pueden provocar una pérdida de potencia. **Mantener fuera del alcance de los niños.**

Utilizar elementos de protección personal durante el manejo del producto. Lavar y desinfectar las manos luego del uso. Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata. No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico. El período de resguardo es de 21 días. Mantener la vacuna refrigerada: entre 2 y 8°C. No congelar. Proteger de la luz El diluyente debe ser almacenado a temperatura ambiente (15 – 30°C).

Para más información ver el siguiente código:



Presentación

Caja conteniendo 10 frascos de 1.000, 2.000 y 4.000 dosis. Caja conteniendo 10 frascos de 10 mL de diluyente azul. Bolsa conteniendo 400, 800, 1.000 o 1.200 mL de diluyente rojo.

Fabricado por: Ceva Animal Health, LLC, USA.

Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA.

Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile.

