

# IMMUCOX<sup>5</sup>

Vacuna viva contra coccidiosis aviar  
producida por *Eimeria acervulina* - *Eimeria*  
*brunetti* - *Eimeria maxima* - *Eimeria necatrix*  
- *Eimeria tenella*  
Suspensión oral.

Reg. SAG N° 2599-B

USO VETERINARIO

Venta bajo receta médico-veterinaria



## Composición

**Immucox<sup>5</sup>** estimula la inmunidad activa contra *Eimeria acervulina*, *E. Brunetti*, *E. Maxima*, *E. Necatrix* y *E. Tenella*.

Cada dosis reconstituida contiene:

*Eimeria acervulina*, Cepa Ceva 502-13 > 151 ooquistes  
*Eimeria brunetti*, Cepa Ceva 505-13m > 40 ooquistes  
*Eimeria máxima*, Cepa Guelph 503-13 > 50 ooquistes  
*Eimeria necatrix*, Cepa Guelph 506-13 > 51 ooquistes  
*Eimeria tenella*, Cepa Ceva 504-13 > 25 ooquistes  
Excipientes c.s.p. 1 dosis  
Preservantes: Dicromato de potasio.



## Indicaciones

**Immucox<sup>5</sup>** está indicada para la inmunización activa, como ayuda en la prevención de coccidiosis producida por *Eimeria acervulina*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria maxima*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria tenella* en pollos broiler, pollas de reemplazo, pollos y pollas de reemplazo de reproductores.

**Establecimiento de la inmunidad:**  
30 días posteriores a la vacunación



## Administración y dosis

Administrar vía oral 0,25 mL/pollo, en dosis única a partir del 1 día de edad hasta los 3 días de edad.

Aplicar únicamente en animales sanos.

Modo de empleo:

Para 10.000 dosis de **Immucox<sup>5</sup>**, añadir 70 g de diluyente de gotitas de gel en 2.5 L de agua destilada fría.

Mezclar bien con una mezcladora.

Agitar bien 10.000 dosis de la vacuna **Immucox<sup>5</sup>**, verter y mezclar con una mezcladora. No es necesaria más agitación si se usa el mismo día.

Vacune en una proporción de 25 mL por cada 100 aves, a través de una máquina o dispositivo de gotitas de gel.



## Advertencias y almacenamiento

No usar en conjunto con ningún medicamento con efecto coccidiostato (anticoccidiales). Si las aves se albergan en un espacio confinado, deben de ser liberadas del confinamiento hacia el sexto día posterior a la vacunación o bien el área debe de duplicarse en tamaño.

Para alcanzar la inmunidad protectora, las aves vacunadas deben tener contacto con los ooquistes excretados por las heces, post vacunación. Mantener fuera del alcance de los niños.

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Periodo de resguardo: 21 días.

**Immucox<sup>5</sup>** debe mantenerse refrigerado entre 2 y 8 °C. No congelar. El diluyente debe mantenerse a temperatura ambiente entre 15 y 30°C

Para mayor información ver el siguiente código:



## Presentación

Estuche conteniendo 10 frascos de 1.000, 2.000 y 5.000 dosis cada uno. Bolsa conteniendo 70 g de Diluyente gel.

Fabricado por: Ceva Animal Health Inc. Ontario, Canadá.

Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA.

Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile.

