



Vacuna viva contra enfermedad de Newcastle y Bronquitis infecciosa, cepa Mass

Polvo liofilizado

Reg. SAG N° 2686-B
USO VETERINARIO

Venta bajo receta médico-veterinaria



Composición

Cevac Vitabron® L es una vacuna diseñada para estimular la inmunidad activa contra virus Newcastle y el virus de la bronquitis infecciosa cepa Massachusetts.

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus bronquitis infecciosa, Cepa Massachusetts H120 $\geq 10^{3.3}$ EID₅₀

Virus de la enfermedad de Newcastle, Cepa PHY.LMV.42 $\geq 10^{5.5}$ EID₅₀

Excipientes c.s.p. 1 dosis.



Indicaciones

Cevac Vitabron® L está indicada en pollos *broilers*, pollos y pollas de reemplazo de reproductores y pollas de reemplazo de ponedoras, como ayuda a la prevención de la Enfermedad de Newcastle y Bronquitis Infecciosa producida por virus tipo Mass.

El establecimiento de la inmunidad se logra entre 5 a 7 días post vacunación y la duración de la inmunidad 28 a 35 días en aves vacunadas al primer día de edad.



Administración y dosis

Administrar 1 dosis /ave.

En pollos *broilers* en dosis única y en pollos y pollas de reemplazo de reproductores y pollas de reemplazo de ponedoras: 2 dosis con un intervalo de 30 a 35 días.

Para la **vacunación intraocular**: Llenar el frasco de la vacuna con el diluyente hasta 3/4 del volumen total para disolver la vacuna liofilizada. Verter y diluir la suspensión de la vacuna en el diluyente restante contenido en el frasco plástico, utilizando el cuentagotas. Aplicar 0,03 mL (una gota) de vacuna en el ojo del ave.

Para la **vacunación por aspersión**: para reconstituir la vacuna utilizar agua destilada estéril, como se explicó en el método de administración en gotas intraoculares. El volumen utilizado varía de 0,2 a 0,3 litros/1000 pollos de días de edad en una caja y de 0,5 a 1 litro por cada 1.000 pollos en cama. Las aves deben quedar ligeramente mojadas después de la vacunación. Agrupar las aves en el suelo o en cajas. Reduzca la iluminación y fumígueles a una altura de 20-30 cm sobre sus cabezas. Repetir la aspersión una vez más.



Advertencias y almacenamiento

Todas las aves del lote deben ser vacunadas al mismo tiempo.

Administrar la vacuna durante la hora más fresca del día, apagando la calefacción e interrumpiendo la ventilación.

Ocasionalmente puede presentarse síntomas respiratorios leves 3 a 6 días después de la vacunación, los cuales desaparecen a los pocos días.

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, salvo con el diluyente estéril recomendado.

No administrar durante la postura.

Mantener fuera del alcance de los niños

Cevac Vitabron® L (polvo liofilizado) debe mantenerse refrigerado entre 2 y 8°C. No congelar. El Diluyente debe almacenarse entre 5 y 25°C. No congelar.

Para más información ver el siguiente código



Presentación

Estuche con 20 frascos de 1.000, 2.000 y 2.500 dosis. Estuche con 10 frascos conteniendo 30 mL de diluyente.

Fabricado por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.
Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA.
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile.



Juntos, más allá de la Salud Animal