



Vacuna inactivada contra Reovirus Aviar

Emulsión inyectable.

Reg. SAG N° 1361-B
USO VETERINARIO

Venta bajo receta médico-veterinaria



Composición

Cevac® Reomune 3 estimula la inmunidad activa con el fin de proveer inmunidad pasiva a la progenie contra Reovirus Aviar en pollas de reemplazo y gallinas reproductoras.

Cada dosis contiene:
Reovirus Aviar, Cepa S1133 $\geq 10^{5.42}$ TCID₅₀
Reovirus Aviar, Cepa 2408 $\geq 10^{5.67}$ TCID₅₀
Reovirus Aviar, Cepa SS412 $\geq 10^{5.26}$ TCID₅₀
Excipientes c.s.p. 0,5 mL
- Preservante: Gentamicina, Anfotericina B, Timerosal.
- Aduvante mineral oleoso



Indicaciones

La vacunación, con **Cevac® Reomune 3**, de las reproductoras provee anticuerpos maternos como ayuda en la prevención de Tenosinovitis (Artritis viral) y Síndrome de Mala Absorción producida por cepas estándar y variante SS412 en la progenie de las gallinas vacunadas

La vacunación debe llevarse a cabo mediante inyección subcutánea en aves sanas a partir de las 18 semanas de edad.



Administración y dosis

Administrar vía subcutánea (bajo la piel del cuello) una dosis de 0,5 mL en dosis única.

Agitar antes y durante la aplicación.
Previo al uso, mantenga la vacuna a temperatura ambiente por 3 - 4 horas.
Administrar en forma aséptica.



Advertencias y almacenamiento

Ocasionalmente, puede observar una reacción local inflamatoria en el sitio de inyección, la cual desaparece espontáneamente, sin necesidad de tratamiento.
Se recomienda inmunizar a las aves con una vacuna viva modificada contra la Tenosinovitis, a lo menos 4 semanas antes de administrar la vacuna inactivada.
Debido al estrés por la manipulación de las aves o traslado, la vacunación de las aves en postura puede causar una caída en la producción de huevos.

Cevac® Reomune 3 tiene un periodo de resguardo de 42 días.

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Cevac® Reomune 3 debe mantenerse refrigerada entre 2° y 8°C. No congelar

Para más información ver el siguiente código:



Presentación

Frasco conteniendo 500 mL (1.000 dosis).

Fabricado por: Ceva Animal Health LLC.

Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA.

Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile.



Juntos, más allá de la Salud Animal